

BOLALARDA MALROTATSIYA

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

GANIYEVA SHAHLO FAYZILLOYEVNA

MUXTAROVA NARGIZA TOXIROVNA

Annotatsiya: Farzandingizning ichaklari, qorin bo'shlig'ida faoliyati to'g'ri holatda bo'lmasa, ichakning malrotatsiyasi tushuniladi. Odatda, ichaklar shakllanayotganda aylanadi va aniq bir joyda to'xtaydi. To'liq aylanish sodir bo'lmasa, ular bo'lmasligi kerak bo'lgan joyga tushishi mumkin. Jarrohlik muammoni hal qiladi, ayniqsa erta aniqlanganda.

Abstract: Malrotation of the intestine is when your baby's intestines are not in the correct position to function in the abdominal cavity. Normally, the intestines rotate as they form and stop in a certain place. If they don't rotate completely, they can end up where they shouldn't be. Surgery can correct the problem, especially if it's caught early.

Аннотация: Мальротация кишечника — это когда кишечник вашего ребенка находится в неправильном положении для функционирования в брюшной полости. Обычно кишечник вращается по мере своего формирования и останавливается в определенном месте. Если он не вращается полностью, он может оказаться там, где ему не следует быть. Хирургическое вмешательство может исправить проблему, особенно если она обнаружена на ранней стадии.

Kirish . Malrotatsiya - bu tug'ma (tug'ilishda mavjud) holat bo'lib, u chaqaloqning qorin bo'shlig'ida (qorin) ingichka va katta ichaklarining joylashishiga ta'sir qiladi. Ichaklar homila rivojlanishining dastlabki davrida shakllanadi. Ushbu jarayonning bir qismi sifatida ichaklar to'g'ri holatga kelguncha va qorin devoriga

yopishguncha aylanadi va aylanadi. Ammo ba'zi hollarda ular o'ralmaydi va to'g'ri aylanmaydi. Bu ichakning malrotatsiyasi deb ataladi.

Asosiy qism . Aksariyat bolalarga ichaklarning joylashishini tuzatish, asoratlarni oldini olish va ovqat hazm qilish tizimining kerakli darajada ishlashiga yordam berish uchun jarrohlik kerak bo'ladi. Volvulus - ichakning g'ayritabiiy burishishi, bu sizning bolangizning ichaklariga qon ta'minotini buzadi. Bu malrotatsiyaning asosiy asoratlari. Bundan tashqari, siz burama ichak yoki o'ralgan yo'g'on ichak deb ataladigan narsalarni eshitishingiz mumkin.

Volvulus chaqaloqning ichaklari qorin devoriga to'g'ri joylarda biriktirilmaganligi sababli sodir bo'ladi. To'g'ri langar bo'lmasa, ichaklar aylanmasligi kerak bo'lgan tarzda buralib qolishi mumkin. Bu burilish hazm qilingan oziq-ovqatning ichak orqali o'tishiga to'sqinlik qilishi va hatto qon oqimini cheklashi mumkin. Bog 'shlangini tasavvur qiling-a, u halqa shaklida buralib, burma hosil qiladi. Shlangni joyini o'zgartirmaguningizcha suv o'tib keta olmaydi. Volvulus bilan oqibatlar ancha jiddiyoq bo'lishi mumkin.

Alomatlar va alomatlar odatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda - ko'pincha ular tug'ilgandan keyingi birinchi oyda paydo bo'ladi va to'satdan qayt qilish (odatda yashil rangda) va shishiradi. Volvulus shoshilinch jarrohlikdir. Davolanmagan volvulus hayot uchun xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin, jumladan:

- Ichak tutilishi.
- Ichak teshilishi.
- Peritonit.
- Sepsis.
- Shok

Malrotatsiyaning belgilari va alomatlari qanday?

Аломатлар ва аломатлар har xil bo'lishi mumkin, lekin odatda tez-tez qayt qilish va qorin og'rig'ini o'z ichiga oladi. Malrotatsiyaning o'zi volvulusga olib kelmaguncha simptomlarni keltirib chiqarmasligi mumkin. Farzandingizning najasida yashil yoki sariq-yashil qusuq yoki qon bo'lsa, mahalliy favqulodda yordam raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bu volvulus yoki boshqa favqulodda vaziyatlarning belgilari bo'lishi mumkin.

Chaqaloqlarda malrotatsiyaning belgilari va belgilari:

- Safro mavjudligi sababli yashil yoki sariq-yashil bo'lishi mumkin bo'lgan tez-tez qusish.
- Shishgan, og'riqli yoki teginish uchun nozik qorin (qorin).
- Qorin kolikasida kuchli og'riq.
- Rektal qon ketish yoki qonli axlat.

Kramplar va malrotatsiyadan og'riqlar bo'lgan chaqaloqlar ko'pincha odatiy holat ko'zatiladi. Ular:

- Oyoqlarini tortib va yig'lash.
- Taxminan 10 dan 15 daqiqagacha tinch turish.
- Yana yig'lashni boshlang.

1 yoshdan oshgan bolalarda quyidagi belgilar va alomatlar mavjud:

- Qorin og'rig'i yoki sezgirligi.
- Ko'ngil aynishi va qayt qilish.
- Diareya.
- Shishgan qorin.
- Qabziyat.
- Rektal qon ketish yoki qonni o'z ichiga olgan axlat.

- Kutilganidek o'smaydi (rivojlanmaslik).

Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2 yoshdan oshgan bolalar chaqaloqlarga qaraganda yashil qusish ehtimoli kamroq. Kattaroq bolalarda odatda takroriy qusish (normal rang) va qorin og'rig'i bor.

Buralgan ichaklarning oldini olish mumkinmi?

Malrotatsiya yoki uning asosiy asoratlari volvulusning oldini olishning hech qanday usuli yo'q, chunki mutaxassislar bunga nima sabab bo'lganini aniq bilishmaydi. Biroq, darhol yordam so'rash bolangizning jiddiy asoratlari xavfini kamaytirishi mumkin. Farzandingiz bilan biror narsa to'g'ri kelmasa, masalan, u qayta-qayta qusayotgan bo'lsa va nima uchunligini tushunolmasangiz - tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderga murojaat qiling. Bu o'z-o'zidan o'tib ketadi yoki siz haddan tashqari tashvishlanyapsiz deb o'ylamang. Malrotatsiya uzoq vaqt davolanmasa, jiddiyoq bo'lishi mumkin.

Farzandimning ichak buzilishi bo'lsa, nima kutishim mumkin?

Farzandingizning dunyoqarashi ko'plab omillarga bog'liq, jumladan:

- Ular qanchalik tez davolanadi.
- Ularning ichaklari qanchalik shikastlangan.
- Ularda bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa har qanday sog'liq sharoitlari.

Jarrohlik ko'plab bolalarga o'zlarini yaxshi his qilishlariga yordam beradi va kelajakdagi asoratlar xavfini kamaytiradi. Ba'zi bolalar operatsiyadan keyin ham ichakning burishishiga duch kelishadi. Yangi jarrohlik usullari bu xavfni kamaytiradi. Farzandingizning g'amxo'rlik guruhi sizga nima kutishingiz haqida ko'proq ma'lumot beradi.

Xulosa : Farzandingizga malrotatsiya tashxisi qo'yilsa, keyingi voqealar haqida o'ylashni to'xtata olmasligingizni ko'rishingiz mumkin. Ular yaxshi bo'ladimi? Ularga jarrohlik kerakmi? Ularning tiklanishi qanday bo'ladi?

Bir vaqtning o'zida bir qadam tashlang va farzandingizning sog'liqni saqlash jamoasiga suyaning. Ular sizning savollaringizga javob berishadi va kelajakdagi yo'lni tushunishingizga yordam beradi. Malrotatsiya juda davolash mumkin, ayniqsa erta tashxis qo'yilganda. Jarrohlik sohasidagi yutuqlar tufayli provayderlar asoratlar paydo bo'lgandan keyin ham murakkab holatlarni davolashlari mumkin..

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Adams SD, Stanton MP. Malrotation and intestinal atresias (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25448782/>). Early Hum Dev. 2014 Dec;90(12):921-925. Accessed 10/8/2024.
2. Dekonenko C, Sujka JA, Weaver K, Sharp SW, Gonzalez K, St Peter SD. The identification and treatment of intestinal malrotation in older children (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30810798/>). Pediatr Surg Int. 2019 Jun;35(6):665-671. Accessed 10/8/2024.
3. International Federation for Gastrointestinal Disorders. Volvulus (<https://iffgd.org/gi-disorders/other-disorders/volvulus/>). Accessed 10/8/2024.
4. Merck Manual (Consumer Version). Intestinal Malrotation (<https://www.merckmanuals.com/home/children-s-health-issues/birth-defects-of-the-digestive-tract/intestinal-malrotation>). Reviewed/revised 8/2023. Accessed 10/8/2024.