

BACHADON ARTERIYASI EMBOLIZATSIYASI.

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi

Jamoat salomatligi texnikumi

IKRAMOV MARXAMAT MAMADIYOROVICH

NAJMIDDINOVA NAZIRA PARDABOYEVNA

Annotatsiya : Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAE) vaginal qon ketishini to'xtatish uchun ishlatiladigan protsedura. Qon ketishiga bachadon miomasi, travma, saraton o'smalari, tug'ish va boshqa holatlar sabab bo'lishi mumkin. BAE minimal invaziv hisoblanadi va bachadonga qon ta'minotini blokirovka qilish orqali ishlaydi.

Abstract: Uterine artery embolization (UAE) is a procedure used to stop vaginal bleeding. Bleeding can be caused by uterine fibroids, trauma, cancerous tumors, childbirth, and other conditions. UTE is minimally invasive and works by blocking the blood supply to the uterus.

Аннотация: Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — это процедура, используемая для остановки вагинального кровотечения. Кровотечение может быть вызвано фибромиомой матки, травмой, раковыми опухолями, родами и другими состояниями. ЭМА является минимально инвазивной и работает путем блокирования кровоснабжения матки.

Kirish . Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAA) - bachadon miomasi (bachadon ichidagi saraton bo'lmagan o'smalar) tufayli kelib chiqqan vaginal qon ketishini davolash uchun eng ko'p qo'llaniladigan minimal invaziv protsedura. Miomadan tashqari, BAA ham travma, malign (saraton) ginekologik o'smalar yoki tug'ruqdan keyingi qon ketishi tufayli favqulodda vaziyatlarda og'ir qon ketishini davolashi mumkin.

Asosiy qism . Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi va bachadon miomasi embolizatsiyasi (UFE) atamalari ko'pincha bir-birining o'rnida ishlatiladi. Biroq, ular boshqacha. UFE - bachadon miomasini davolovchi BAAning o'ziga xos turi. BAA

bachadon miomasini va vaginal qon ketishiga olib kelishi mumkin bo'lgan bir qator boshqa kasalliklarni davolaydi.

Nima uchun bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAA) davosi amalga oshiriladi?

Odamlarga bachadon arteriyasi embolizatsiyasiga muhtoj bo'lgan eng keng tarqalgan sabab bachadon miomasi o'smalarini davolashdir, ular quyidagi belgilarga olib keladi:

- Og'ir hayzli qon ketish.
- Tos bo'shlig'idagi bosim.
- Qabziyat.
- Og'riqli jinsiy aloqa.
- Tez-tez siyish.

Sizning tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderingiz tug'ruqdan keyin ko'p qon ketish, travma yoki saraton o'smalari kabi boshqa holatlar uchun BAA ni tavsiya qilishi mumkin. Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAA) quyidagi hollarda amalga oshirilmasligi kerak:

- Alomatlarsiz bachadon miomasi bor.
- Homilador.
- Tos a'zolari infeksiyasiga ega bo'ling.
- Tomirlar, arteriyalar va qon tomirlariga ta'sir qiladigan kasallik bor.
- Kontrastli bo'yoqlarga allergik reaksiyaga ega bo'ling (BAA uchun ishlatiladi).

Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAA) qanday ishlaydi?

BAAda mayda zarrachalar (masalan, qum donalari) bachadonga olib boradigan qon tomirlariga yuboriladi. Bu zarralar bachadon arteriyalariga yupqa, egiluvchan trubka (kateter deb ataladi) orqali floroskopiya, harakatlanuvchi tasvirlarni ushlaydigan rentgen nurlari yordamida yo'naltiriladi. Bachadon qon tomirlari ushbu zarralar tomonidan bloklanganda:

- Sizning provayderingiz ortiqcha qon ketishini nazorat qilishi mumkin.
- O'smalar yoki miomalar qisqaradi, chunki ularning qon ta'minoti to'xtatiladi.

Aksariyat protseduralar ba'zi xavflarni o'z ichiga oladi. Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAA) uchun xavflar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

INFEKTSION: Kateterni kiritish mintaqadagi boshqa qon tomirlariga zarar etkazishi yoki infektsiyani keltirib chiqarishi mumkin.

Sog'lom to'qimalarning shikastlanishi: emboliya agenti noto'g'ri qon tomiriga yotqizilib, sog'lom to'qimalarga qon ta'minotini to'xtatib qo'yishi mumkin.

Allergik reaksiya: rentgen kontrastli bo'yoqlarga yoki sedativ dorilarga allergik reaksiya paydo bo'lishi mumkin.

Hayz ko'rish davrining yo'qolishi: 1% dan 5% gacha odamlarda, bachadon arteriyasi embolizatsiyasidan keyin hayz ko'rish tsikllari doimiy ravishda yopiladi.

Jarrohlik muvaffaqiyatsiz: simptomlaringiz qaytishi mumkin va ikkinchi BAA yoki histerektomiya kerak.

Bepushtlik: homilador bo'lish qobiliyatini yo'qotasiz.

Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAA) xavfsizmi?

Ha, bachadon arteriyasi embolizatsiyasi ko'p hollarda xavfsiz protsedura hisoblanadi. Tibbiy xizmat ko'rsatuvchi provayderingiz tibbiy tarixingiz asosida siz bilan BAA xavfini muhokama qiladi.

Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAA) kelajakdagi homiladorlikka ta'sir qiladimi, degan savol hali ham mavjud. Ba'zi provayderlar, agar odam ko'proq farzand ko'rishni xohlasa, miomani jarrohlik yo'li bilan olib tashlashni afzal ko'radi. Birlashgan Arab Amirliklaridan keyingi homiladorlikda abort qilish ko'proq bo'lishi mumkin va sezaryen va tug'ruqdan keyingi qon ketish ehtimoli ko'proq. Agar siz homilador bo'lsangiz yoki homilador bo'lishni istasangiz, BAA xavfi haqida provayderingiz bilan gaplashing.

Xulosa . Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi (BAE) mioma, tug'ruqdan keyingi og'ir qon ketish va boshqa ginekologik o'smalarni davolash uchun minimal invaziv protseduradir. BAE hamma uchun emas - shuning uchun protseduraning xavflari va foydalari haqida tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderingiz bilan gaplashing. Agar siz homilador bo'lsangiz yoki homilador bo'lishni istasangiz, BAE sizga mos kelmasligi

mumkin. BAEdan o'tgan ko'pchilik odamlar bir necha oy ichida alomatlaridan xalos bo'lishadi. Birlashgan Arab Amirliklarining og'ir asoratlari kamdan-kam uchraydi, ammo sodir bo'lishi mumkin. Ushbu protseduradan o'zingizni qulay his qilish uchun provayderingiz bilan tashvishlaringizni muhokama qilishni unutmang.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Memtsa M, Homer H. Complications Associated with Uterine Artery Embolisation for Fibroids . Obstet and Gynecol Int. 2012;2012:290542. Accessed 10/24/2022.
2. RadiologyInfo.org. Uterine Fibroid Embolization (UFE) . Accessed 10/24/2022.
3. Schirf BE, Vogelzang RL, Chrisman HB. Complications of uterine fibroid embolization . Semin Intervent Radiol. 2006;23(2):143-149. Accessed 10/24/2022.
4. Smith SJ. Uterine Fibroid Embolization . Am Fam Physician 2000 Jun 15;61(12): 3601-3607, 3611-2. Accessed 10/24/2022.
5. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Uterine Artery Embolization (UAE) . Accessed 10/24/2022.