

TO‘QIMA PLASTIKASI TURLARI.

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

MUXTAROVA FOTIMA MUXAMMADIYEVNA

MUXTAROVA NARGIZA MUXAMMADIYEVNA

Annatsiya : Ushbu maqola to‘qima plastikasi turlari , bu borada olib borilayotgan ishlar , plastika bemorlarga nima uchun kerak ekanligi haqida malumotlar beradi.

Kalit so‘zlar : mahalliy plastika , Italyancha usul, Parchasimon teri plastikasi :

Abstract: This article provides information about the types of tissue plastic surgery, the work being done in this area, and why patients need plastic surgery.

Keywords: local plastic surgery, Italian method, Fractional skin plastic surgery:

Резюме: В данной статье представлена информация о видах тканевой пластики, работах, проводимых в этом направлении, а также о том, зачем пластика нужна пациентам.

Ключевые слова: локальная пластика, итальянский метод, лоскутная кожная пластика:

Teri plastikasi keng tarqalgan bo‘lib, ko‘pincha erkin yoki erkin bo‘lmagan xildagi teri plastikasi ishlatiladi. Erkin bo‘lmagan teri plastikasi: teri va teri osti yog‘idan ko‘chirib olinadi, bu holda qon aylanish sistemasi tanadan transplantat oyoqchasi orqali bajariladi. Transplantat oyoqchasi iloji boricha keng bo‘lmog‘i lozim va uni bogiam qisib qo‘ymasligi kerak. Regionar teri plastikasi uchun atrofdagi to‘qimalardan foydaniladi Mahalliy plastika hamma vaqt chandiqlarni olib tashlab, jarohat chekkalarini tozalab bajariladi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Mahalliy plastika atrofdagi to'qimalar ajratilgach, teri nuqsoni odatdagicha tikib tuzatiladi.
2. Nuqson chekkasidan 5-15 sm narida kuchsizlantiruvchi kesishlar bajarib, jarohatni tikish mumkin.
3. Teri nuqsoni yaqinidan tilga o'xshash sogiom aylanuvchi teri parchasini olish mumkin. Sog'lom to'qimada hosil bo'lgan kemtik joyga chok qo'yib berkitiladi.
4. Z-ga o'xshash yoki bir-biriga yaqinlashuvchi uchburchak usuli. Chandiqlik kesilib to'qimalar plastikaga tayyorlangach, bir-biriga qaramaqarshi joyda chekka kesimi bajariladi, ular uchburchak shaklida bo'ladi. Teri nuqsonini tuzatish uchun A. A. Limberg yoki Moresten usullari (ko'pincha bir-biriga yaqin keluvchi uchburchak kesimlar) qo'llaniladi.

Mahalliy teri plastikasi odatda yaxshi natija beradi, ammo u unchalik katta bo'lmagan jarohatlarni yopishga imkon beradi. Agar teri kemtigi keng bo'ladigan bo'lsa, uni yopish uchun tananing uzoq joyidan qon tomirli oyoqchasi yordamida teri bo'lagini (masalan, qorindan) ko'chirib o'tkazish mumkin. Uzoqdan band bilan ko'chirib o'tkazilayotgan teri plastikasi quyidagi usullarni o'z ichiga oladi:

I. Italyancha usul. Bu usul yordamida faqat burun plastikasigina emas, balki tananing boshqa sohadagi nuqsonini ham tuzatsa bo'ladi. Masalan, o'ng tovondagi teri nuqsonini bartaraf etish uchun chap oyoqning son yoki boldir sathida terining nuqsonni to'la qoplay oladigan bir parchasi ko'chiriladi. Shu yerga chap oyoq, tovonni yaqinlashtirilib bog'lanadi va so'ngra tovondagi teri nuqsoni chap oyoq teri parchasi bilan yopib qo'yiladi. Tovonda teri 10-15 kun ichida bitadi. Bu davrda tovon songa gips bog'lami bilan taxtakachlab qo'yiladi. Transplantatsiya qilingan teri bo'lagini chap sondan kesib olish oldidan uning asosini qisqich bilan qisib turib, plastika qilingan teri parchasining (transplantatni) hayotiyiligi nazorat qilinadi. Agar bunda teri parchasi ko'karsa, terida qon aylanishi yetishmasligi ma'lum bo'ladi va teri asosi kesilmaydi.

II . Parchasimon teri plastikasi terini bosqichma-bosqich band bilan ko'chirib o'tkazish, transplantatni ona to'qimasidan uzib qo'ymagan holda tananing boshqa joyiga ulash (transplantat yangi joyga qo'shilib bitib ketgach, ona to'qimadan kesib tashlanadi). Shuningdek: - teri parchasini keng bandda ko'chirib o'tkazish; - hindcha va italyancha usullar; - ko'priksimon teri parchasini ko'chirib o'tkazish; - yumaloq Filatov uslubi bilan: a) uzun poya (tana) bilan; b) qadamlovchi; d) naysimon granulyatsiyalashgan (epidermisi ichiga qaratilgan) poya bilan.

Ko'chuvchi yumaloq teri parchasi plastikasi. Bu usul rus oftalmologi V. T. Filatov (1917) nomi bilan bog'liq. Yumaloq teri parchasini tananing uzoq sohasidan ko'chirish mumkin. Buning uchun qorinning old qismida mushak pardasida ikkita parallel kesma qilinadi. Bu kesmaning teri va teri osti yog' qavati chetlari bir-biri bilan tikiladi. U holda chemodan ushlagichga o'xshash teridan chiqqan yumaloq teri transplantat hosil bo'ladi. Terini kesib olishdan hosil bo'lgan tanadagi teri kemtigiga choklar qo'yiladi. Ikki tom onlam a ona to'qim a bilan bog'liq bo'lgan chem odan ushlagichga o'xshash transplantatda 10-12 kun ichida tom irlar o'sib kiradi, k o llateral qon aylanishi vujudga keladi. S o 'n g ra «teri ushlagich»ning bir oyoqchasi (ko'chirib o'tkaziladigan joydan uzoqdagisi) kesib olinadi va teri kemtigiga tikiladi. Ko'chirib o'tkazish muolajasi 4 haftadan keyin bajarilgani m a'qul. Agar teri defekti uzoq joylashgan bo'lsa, kesib olingan terining bir tomonlama oyoqchasini ko'chirib, boshqa joyga (masalan, qo'lga yoki oyoqqa) tikiladi. Shuni hisobga olish kerakki, har bir teri oyoqchasining bitishi 3-4 haftaga cho'ziladi. Bir sohadan ikkinchi sohaga o'rmalashda teri oyoqchasiga qisqich qo'yib, uning qon bilan qanday ta 'minlanganligini tekshirish zarur. Terini ko'chirib o'tkazishda bemorni operatsiyadan oldin tayyorlash lozim: hayotiy organ va sistem alar kuchini oshirish, shuningdek, granulyatsiyalayotgan jarohatni tozalamoq zarur. Xlorid natriy, gipertonik eritmalar, Vishnevskiy surtma dorisi, proteolitik fermentlar (tripsin, papain, proteinaza va boshqalar) qo'llaniladi. Ba'zan teri plastik asi uchun nekroektom iya qilinadi, granulyatsiya to 'qimasi qirib tash lan ad i, antiseptik moddalar, vannalar qo'llaniladi. Hozirgi kunda katta nuqsonlarni erkin teri segmenti bilan yopilganda

tomir anastomozi qo'yilishi uchun mikroxirurgiya usuli ishlatiladi va 1,2 mm gacha bo'lgan tomirlar mikroskop ostida ulanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. А.Воисев «Тери-таносил касалликлари». Бичими 60х90 1/16. 20 б.т.
2. Н. Абдуллаев., Х. Каримов., Б. Ирис^улов. «Патологик физиология». Бичими 60х90 1/16. 40 б.т