ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПАЦИЕНТОМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Ахорова Малика Шавкатовна
Научный руководитель
Ускинова Назира Алимжон кизи *- Ординатор*
Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра детской стоматологии

Аннотация: В данной статье говорится о том, что несоблюдение пациентами гигиены в процессе ортодонтического лечения приводит к многочисленным осложнениям. Представлены результаты проведенного нами исследования.

Ключевые слова: Брекет-система, индекс Улитовского (ОРТО), кариес, гингивит

Введение: Ортодонтическое лечение требует от пациента повышенного внимания к своему состоянию, так как во время активного лечения возрастает риск развития кариеса и заболеваний десен. В процессе лечения крайне важно поддерживать гигиену полости рта: правильно питаться и регулярно чистить зубы. Грамотная техника очистки и использование дополнительных средств личной гигиены для полости рта являются ключом к успешному лечению.

Цель: изучить гигиену полости рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение, и рассмотреть возможные ошибки и осложнения, возникающие при нарушении гигиены полости рта.

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 15 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый пациент на момент исследования проходил лечение с использованием несъемного ортодонтического аппарата - металлической брекет-системы, зафиксированной на вестибулярной поверхности зубов верхней и нижней челюсти. Нами было проведено анкетирование, клиническая беседа для оценки уровня гигиенических знаний и клинический осмотр с окрашиванием зубов и слизистой оболочки полости рта для определения уровня гигиены полости рта и выявления возможных осложнений.

Результаты: Во время клинического осмотра уровень гигиены полости рта изучался с помощью индекса Улитовского ОРТО, который показал, что у 98% обследованных была неудовлетворительная гигиена полости рта и состояние ортодонтических конструкций. Из 15 обследованных пациентов умеренный

гингивит был выявлен у 25% пациентов; легкий гингивит - у 75% пациентов. Помимо гингивита различной степени тяжести, у 17% пациентов с металлической брекет-системой был обнаружен первичный кариес, причем все очаги кариеса располагались на контактной поверхности.

Выводы: выявлена прямая взаимосвязь между уровнем гигиены полости рта и уровнем гигиенических знаний пациентов при ношении ортодонтических конструкций. У пациентов с низким уровнем гигиенических знаний наблюдался неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. Ошибкой при нарушении гигиены полости рта является неудовлетворительная и плохая гигиена полости рта, наиболее часто встречающимися осложнениями – гингивит и кариес на контактных поверхностях.

Использованные литературы

(Современная детская стоматология и ортодонтия, 15-16 апреля 2021 г.)
(Денисова, Минск 2007)
(Токаревич, 2016)
(Персин, 2015)